

-















ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO PRECAUCIONES Y ADVENTENCIAS DE USOS : LAS CUÍDADOS ENSOS LAS CUÍDADOS EN ENTRE ENT

viento, evitando derrames. Para evitar un accidente durante la aplic contra del viento. No use la boca para succionar sifones para tra nine el equipo de aplicación lavándolo con detergente y una solución n

CAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO O COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ES nga su equipo de protección limpio, laxiendolo con agua y jabón abundante, poniendo atención al envés de guantes y mascanilas. Le con fecuencia los filtros del respirador, Después de un dia de trabajo, báriese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

- OCOMA BEBA O INJECTURANO ESTE INFONDUCTO"

 OCOMA BEBA O INJECTURANO ESTE PRODUCTO"

 WITHOUSE FRANCISCE MANDA ESTE INFONDATORIA MEDICAS RIPA O POPRAJES"

 OSE IRABEDA CINA CIAVEDE LOS MOSOS, MUERES BRAPAZADAS, EN LACIDANDA Y ANMALES DOMÉSTICOS"

 WITHOUSE SE PRANCISCE MANDA EN PRODUCTO SALIMBRIADAS, EN LACIDANDA Y ANMALES DOMÉSTICOS"

 OLUMACIBE DI CANCIO NO DEBEN MANLELA BETE PRODUCTO Y METES DE CONSUMINALMENTOS

 'SOMENDES DE FANCIS NO DEBEN MANLELA BETE PRODUCTO SALIMBRIA MANCIS LE PRODUCTO CONI OS ADOS PIEL"

 "DA LICELA OPRIADA DE TRABAJO BÁRIESE Y PONGASE ROPA LIPIPA"

 DE NOBERA, INHALE Y ENTRESE LO CANCIO CONI OS ADOS PIEL"

 "DA LICELA OPRIADA DE TRABAJO BÁRIESE Y PONGASE ROPA LIPIPA"

 DE NOBERA, INHALE Y ENTRESE LO CANCIO CONI OS ADOS PIEL"

 "DA LICELA OPRIADA DE TRABAJO BÁRIESE Y PONGASE ROPA LIPIPA"

 SER MOSTERA, INHALE SEL PRODUCTO CONI OS ADOS PIEL"

 "DA LICELA OPRIADA DE TRABAJO BÁRIESE Y PONGASE ROPA LIPIPA"

 SER MOSTERA, INHALE SEL PRODUCTO CONI OS ADOS PIEL"

 "DA LICELA OPRIADA DE TRABAJO BÁRIESE Y PONGASE ROPA LIPIPA"

 SER MOSTERA, INHALE SEL PRODUCTO CONI OS ADOS PIEL"

 "DA LICELA OPRIADA DE TRABAJO BÁRIESE Y PONGASE ROPA LIPIPA"

 SER MOSTERA, INHALE SEL PRODUCTO CONI OS ADOS PIEL"

 "DA LICELA OPRIADA DE TRABAJO BÁRIESE Y PONGASE ROPA LIPIPA"

 "SENDA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA
- DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA"

 "ASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉS TRELE ESTA ETIQUETA"

 "ASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉS TRELE ESTA ETIQUETA"

BEROS AUXIL.DS En paco de inicicación, solicil aserción midical mieritas play sertier al paciente del área comin misur) y decontaminar interes para entre propiedo de propiedo de la propi CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE, ENOS AUXILIOS: En caso de intoxi ndo el parpado superior e inferi MENDACIONES AL MÉDICO

Verpo Culmica Prendete.

Yarpo Culmica Prendete.

Yarpo Culmica Prendete.

All pel el cual designarea al poco tiempo. Los sintomas por discessorio el inducer de inducerdado y deseggia resa. Pel deseggia testa de deseggia como el como como el como como el como de la como como de la como el como

- NEIDAS PAGA PROTECCIÓN AL MARBYTE

 LURANTE EL MANLO DE PRODUCTO, PATEL A CONTAMINACIÓN DE SUEJOS, BIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PREBAS, CAVALES O

 LURANTE EL MANLO DE PRODUCTO, PATEL A CONTAMINACIÓN DE SUEJOS, BIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PREBAS, CAVALES O

 LURANTE EL MANLO DE PRODUCTO, PATEL A CONTAMINACIÓN DE SUEJOS, BIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PREBAS, CAVALES O

 LORDOS DE AGUA, NO LAVANDO O VETIENDO DE LAGUNAS DE PAGALICIDAS DEPAGALICIDAS DE PAGALICIDAS DE PAGALICIDAS DEPAGALICIDAS DE PAGALICIDAS DEPAGALICIDAS DE PAGALICIDAS DEPAGALICIDAS DE PAGALICIDAS DEPAGALICIDAS DEPAGALICIDAS DE PAGALICIDAS DEPAGALICIDAS DEPAGALI
- EN CASO DE DEFRAMES, SE DEBERÁ USAR ÉCUPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DEFRAMADO CON
 AGUN MATERIA, ASSORBENTE POR ECIPIO, TERRA O ARCILLA, COLECURA LOS ESECHOS EN UN RECUPBITE HERMÉTICO Y
 LEMARD OU, CENTRO E ACOPPO DE RESINDOS PELAGASOS AUTORAZODANS CERCANO,
 LEMARD OU, CENTRO E ACOPPO DE RESINDOS PELAGASOS AUTORAZODANS CERCANO,
 LEMARD OU, CENTRO E ACOPPO DE RESINDOS PELAGADOS EN LIBRADOS EN LA DESPONSACIONES DE CONTENEDOR DONDE PREPARE
 PRODUCTOR DE PROPERTA DE CONTENEDOR DONDE PREPARE
- L'ANEZCIA, PARA APLICACIÓN.

 L'ANEZCIA, PARA APLACIÓN.

 ESTE PRODUCTO ES ENTERMANAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PRESS, INVERTIBIRADOS ACLÁTICOS) Y PLAVIDS ACLÁTICAS (PARA AGUATICAS) (PARA AGUATIC
- ET 09 18











"USO AGRICOLA"

•

Eternity 10 CE

Insecticida / Concentrado Emulsionable

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO: % EN PESO

Bifentrina: 2-metil-3-fenilbencil-(1RS)-cis-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop--enil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilato 10.87

Equivalente a 100 g de i.a./L a 20°C INGREDIENTES INERTES:

Emulsificantes y solvente TOTAL: 100.00

REG. RSCO-INAC-0176-328-009-011 CONTENIDO NETO: 950 m



Nocivo en caso de Ingestión

Fecha de fabricación: Lote No. :

Fecha de caducidad: 2 años después de su fecha de fabricación

Distribuido por:

NUFARM GRUPO MÉXICO, S. de R.L. DE C.V.
XOCHITI 173 INTERIOR 2
COL, CIUDAD DEL SOL
ZAPOPAN, JALISCO, 45050

TEL: (33) 3121 4108

"HECHO EN ISRAEL"

"ENVASADO EN MÉXICO"

Nufarm 5

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS INSTRUCCIONES DE USO

jSIEMPRE CALIBRE SUEQUED DE ÁPLICACIÓN.

Eternity 10 CE es un insecticida pierocide que actúa por conducto e ingestión, utilizado para el control de las plagas de foliaje y en los cultivos mencionados en el Cuatro de Recomendaciones:

Cultivo	Plaga	Dosis Producto	Observaciones
		Formula do L/ha	
erenjena, Chile (7)	Mosquita Blanca		Realice la primera aplicación cuando se detecten los primeros adultos y/o ninfas
Jitomate (3)	Bernisia argentifolii	0.5-0.6	de mosquita blanca en el follaje, o bien cuando se detecten las primeras larvas y/o
mate de Cáscara	Gusano Soldado		daños en el cultivo por la alimentación de las larvas de gusano soldado.
Papa (1)	Spodoptera exigua		Realice otras dos aplicaciones a intervalos de 7 días cada una.
Brócoli	Mosquita Blanca		Realice la primera aplicación cuando se detecten los primeros adultos y/o ninfas
Col	Bernisia argentifolii		de mosquita blanca en el follaje, o bien cuando se detecten las primeras larvas y/o
Col de Bruselas	Gusano Falso Medidor	0.4-0.6	daños en el cultivo por la alimentación de las larvas de talso medidor y/o palomilla
Coliflor	Trichoplusia ni		dorso de diamante.
(7)	Palomilla Dorso de		Realice otras dos aplicaciones a intervalos de 7 días cada una.
	Diamante		
	Plutella xylostella		
Algodonero	Mosquita Blanca	0.4-0.6	Realice la primera aplicación cuando encuentre los primeros adultos, realice otras
(30)	Bernisia argentifolii		dos aplicaciones con intervalo de 7 días.
alabaza, Calabacita	Mosquita Blanca	0.4 - 0.6	Realice la primera aplicación cuando encuentre los primeros adultos, realice otras
Melón, Pepino,	Bemisia argentifolii		dos aplicaciones con intervalo de 7 días.
Sandia (3)			
Lima, Limonero,	Psílido de los átricos	0.5-0.6	Realice la primera aplicación cuando se detecten los primeros adultos y/o ninfas
andarina, Naranjo	Diaphorina citri		del psilido en los brotes. Realice la segunda aplicación a un intervalo de 7 días.
Toronjo (1)			
Maiz	Gusano cogollero	0.2-0.3	Realice la primera aplicación cuando se detecten las primeras larvas sobre el
Sorgo (18)	Spodoptera frugiperda		cultivo. Realice la segunda aplicación a un intervalo de 5 días
Intomical order or	middle Discours do		Interests do no meldad. Discours dabon transporteriorate la última antiposida el la passaba
Internals do so	muided Discours do	hon transportering	ntro la última anliagaión y la pagada

Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

-

Tiempo de reentrada a zonas tratadase; 24 horas.
MÉTODOS PARA PREPARAN Y CALCARI EL PRODUCTO: Forma de abrir el envase; Deserrosque la tapa, hasta romper el
sello exterior, posteriormante deseguele esho de seguridad interno, evitando ininad el producto.
Perparación: Llene el tranque de apicación a initad de su capacidad con agua, agregue tes dossa aqui recomendadas del
productor. Llene el tranque de apicación a la mitad de su capacidad con agua, agregue las dossa aqui recomendadas del
productor. Llene el tranque de apicación, para assegurar una mezcia uniforme y una buera cobertura del foliaje.

Prepare só la cantidad de solución necesaria para la aplicación.

CONTRAINDICACIONES. Realize las aplicaciones en las primeras horas de la mariana o por la tarde, realize las aplicaciones a la forma de vierto, no aplique este producto cuando la velocidad del vierto sea mayor a 15 km/h. No aplicar este producto a través facro del vierto, no aplique este producto cuando la velocidad del vierto sea mayor a 15 km/h. No aplicar este producto a través de cualqui er to tende de signación. Para aveltar el riesgo de residuos en los alimentos, respete los días entre la utilima aplicación y la cosente alternado de signación. Para aveltar el riesgo de residuos en los alimentos, respete los días entre la utilima aplicación y la cosente alternado de signación. Para en el riesgo de residuos en los cultivos y a las doses recomendadas bajo las anteriores instrucciones en CONTINIDAD. Eternity 10 CE no es fitolóxico en los cultivos y a las doses recomendadas bajo las anteriores instrucciones.

INCOMPATIBILIDAD: bis se ha deletado incompatibilidad on los agentes relucions como polos de años y apentes extintores de liago, como fisition nonceambios y aqua se incompatibile con agentes oddentes como al Permaganato de potado. Para el caso or agon esparted de recomienta hacer pruebas previas en campo cuando se deseen reactir con otros productos. Para el caso de agentes oxidantes como el Permaganato de potados el se ha deletado incompatibilidad. Si se deseam realizar reactios, esta adeletado incompatibilidad. Si se deseam realizar reactios, esta adeletado incompatibilidad. Si se deseam realizar reactios, esta adeletado incompatibilidad de portado de competencia de la capacida confidencia competencia en los sessiones de agentes oxidantes como el Permaganato de potados el se na deletado incompatibilidad. Si se deseam realizar reactios, esta agente de actual de agente de actual de ac

cultivos que aquí se indican.

MANEJO DE FRESSITENCIA

MANEJO DE FRESSITENCIA

MANEJO DE FRESSITENCIA

DE APLICACIÓN: ENTE EL USO REFETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE

DE APLICACIÓN: ENTE EL USO REFETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE

DIFERBYITES MODOS DE ACCIÓN Y DE FRENITES MACEJANSMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL JAPOYO DE OTROS

DIFERBYITES MODOS DE ACCIÓN Y DE FRENITES MACEJANSMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL JAPOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.









