Anfibius CaBZ

FICHA TÉCNICA

Nutriente
Suspensión acuosa

Anfibius CaBZ es un fertilizante de alta asimilación que ayuda al incremento de la floración y amarre de fruto. El calcio (Ca) es un cofactor de enzimas y el boro (B) es esencial en el desarrollo de meristemos, ambos intervienen en la división celular generando una correcta maduración del fruto. El zinc (Zn) participa en la formación de clorofila, favoreciendo la síntesis de auxinas, lo cual mejora los rendimientos, calidad y duración del fruto.
Los ácidos orgánicos y las oligosacarinas de **Anfibius CaBZ** estimulan los procesos metabólicos para el crecimiento de tallos, hojas, flores y frutos.

BENEFICIOS

- Incrementa la floración y el amarre del fruto.
- Correcta formación del fruto.
- Evita caída de frutos jóvenes, necrosis, acorchado, pudriciones apicales y rajado de frutos.
- Disminuye perdidas por rechazo de frutos.
- Rápida asimilación en la planta.
- Es de fácil manejo y aplicación.
- Ambientalmente seguro.

RECOMENDACIONES DE USO:

Destape con cuidado el envase, mida la cantidad indicada de **Anfibius CaBZ** y realice una premezcla en un recipiente con agua, para posteriormente vaciarla al tanque de mezcla agitando constantemente.

Aplicar **Anfibius CaBZ** vía foliar, cubriendo la mayor parte del follaje de la planta.
No aplicar con altas temperaturas, ni cuando exista alta velocidad del viento o amenaza de lluvia.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Calcio (CaO)	8.0%
Boro (B)	1.0%
Zinc (Zn)	1.0%
Oligosacarinas	3000 ppm
Ácidos orgánicos	3.0%

INCOMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

CULTIVO	DOSIS L/ha	RECOMENDACIONES
Ajo, Alcachofa, Algodón, Arándano, Berenjena, Brócoli, Calabaza, Cebolla, Chile, Col, Coliflor, Ejote, Esparrago, Frambuesa, Fresa, Lechuga, Melón, Papa, Papayo, Pepino, Pimiento, Piña, Rábano, Sandia, Tomate, Zanahoria, Zarzamora	1-2	Desde los 15 a 20 días después del trasplante o siembra hasta el inicio del llenado, en intervalos de 15 días o al aparecer las primeras deficiencias.
Aguacate, Banano, Café, Cítricos, Durazno, Guayabo, Higo, Mango, Manzano, Nogal, Ornamentales, Pera, Vid	0.5-1/100 L de agua	Durante prefloración, caída de pétalos, cuaje y engorde de fruto.
Granos	1-2	Desde inicio de espigado antes de la polinización.

Carretera León Manuel Doblado km 10.5, Col. El Ramillete. León, Gto. C.P. 37668 Tel. + 52 (477) 790 2533
www.serviagromx.com

Serviagro
Produciendo cambios