

Insecticida-acaricida orgánico / líquido

GENERALIDADES

TrytOrg es un producto formulado a base de extractos botánicos, aceites y terpenos naturales con acción insecticida y de repelencia para el control de plagas en todo tipo de cultivos.

La composición de **TrytOrg** al contacto con el agua forma una emulsión, la cual al ser aplicada vía foliar crea una película irritante para los insectos sin dañar la superficie vegetal.

El modo de acción de **TrytOrg** se fundamenta en: Generar daños al sistema nervioso del insecto, el efecto de repelencia de **TrytOrg** causa inhibición de la actividad alimentaria de los insectos, tiene efecto ovicida, rompe la estructura que cubre a los insectos y larvas. Además de inhibir los cambios de estadios de larva, ninfa o pupa.

BENEFICIOS

- Efecto irritante, repelente sistémico y de contacto.
- No genera resistencia.
- Interrumpe el ciclo de vida.
- Actúa como insecticida y acaricida, entre otros.
- Daña el sistema nervioso, digestivo y el exoesqueleto de los insectos.
- Genera en el insecto hiperactividad, convulsiones y parálisis.
- Efecto Knockdown.
- Activa mecanismos secundarios de defensa de las plantas.
- No se acumula en cuerpos de agua ni en la solución del suelo.

COMPOSICIÓN

Extracto de ajo _____	10%
Extracto de canela _____	5%
Extracto de chile _____	5%
Terpenos cítricos _____	3%
Extracto de neem _____	1%
Acondicionadores _____	76%
Total _____	100%

INSTRUCCIONES PARA SU USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aguacate, Ajo, Alcachofa, Algodón, Arándano, Banano, Berenjena, Brócoli, Café, Calabaza, Cebolla, Cítricos, Chile, Col, Coliflor, Durazno, Ejote, Espárrago, Espinaca, Frambuesa, Fresa, Granos, Guayabo, Higo, Lechuga, Mango, Manzano, Melón, Nogal, Ornamentales, Papa, Papayo, Pepino, Pera, Pimiento, Piña, Quenopodiáceas, Rábano, Sandía, Tomate, Vid, Zanahoria, Zarcamora	Mosquita blanca, Pulgón, Araña roja, Trips, Gusano, <i>Psilidos</i> , <i>Ácaros</i>	1 a 5 mL / L de agua 0.5 L - 0.75 L / ha Pipa 2000 L 1-1.5 L / ha	Aplicar al follaje al identificar la presencia del insecto o ácaro. Repetir aplicación al 3er día. Aplicación foliar en intervalos de 15 a 20 días.



FICHA
TÉCNICA

Insecticida-acaricida orgánico / líquido

INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda realizar la aplicación por la mañana o tarde vía foliar en campo o en invernadero.

PLAGAS A ERRADICAR:

Pulgones, mosquita blanca, araña roja, ácaros, psilidos, trips, gusanos.

